



Tel.: 02 - 700 64 38
(Du lundi au vendredi 9:00 - 17:30)
E-mail: laboratoire@idexx.com

09-0021080-00 2026-V1

CODE BARRE	INFORMATIONS SUR L'ANIMAL	NE PAS REMPLIR	CACHET DU VÉTÉRINAIRE
Collez ici votre code barre	☐ Chien (canine) ☐ Chat (feline) ☐ Cheval (equine) ☐ Bovin (bovine) ☐ mâle (male) ☐ femelle (female) ☐ castré(e) (neutered) Âge (age) année(s) (years) mois (months) ☐ Autre : (other (please specify!)) ☐ Nom de l'animal (name/microchip no.)	☐ U ☐ AB ☐ ABT ☐ eSwab ☐ K ☐ HA ☐ HS ☐ Milch ☐ PU ☐ OB	En envoyant ce formulaire au laboratoire, vous acceptez nos conditions générales : www.idexx.be IDEXX accorde une grande importance au traitement correct des données personnelles et applique la politique de confidentialité disponible à l'adresse www.idexx.com/privacy.

Date de prélèvement de l'échantillon : (date of sampling)	<i>Veuillez indiquer</i>	Durée des symptômes : (duration of symptoms)	<i>Veuillez indiquer</i>	NE PAS REMPLIR (Code-barres Labor)
Traitement déjà prescrit/autres commentaires/diagnostic provisoire : (Further comments/Treatment/Provisional diagnosis)				

MATÉRIEL		EXAMEN (EXAMINATION)	MATÉRIEL		EXAMEN (EXAMINATION)
☐ AA Écouvillon, oeil (conjonctive) (swab, eye (conjunctiva))	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)	☐ AHA Écouvillon, peau (swab, skin)	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)
☐ ATR Écouvillon, trachée (swab, trachea)	☐	KMY Mycologie (mycology)	☐	☐	KMY Mycologie, seulement levures (pe. <i>Malassezia</i> sp.) (mycology, yeasts only) (Pour les dermatophytes, veuillez envoyer un prélèvement cutané ; voir au verso) (for dermatophytes please submit skin scraping; see reverse)
☐ ANA Écouvillon, nez (swab, nasal)	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)	☐ Lait (seulement bovin) (milk, bovine)	☐	Examen bactériologique et mycologique (bacteriological and mycological examination)
☐ AOH Écouvillon, oreille (swab, ear)	☐	KMY Mycologie (mycology)	☐ MIVR- av. droit (MIVR)	☐	
☐	☐	Culture bactériologique (aérobie) (y compris les levures) (yeasts incl.)	☐ MIVL- av. gauche (MIVL)	☐	
☐	☐	PKAN Culture bactériologique (aérobie) (+otite moyenne) (+ otitis media)	☐ MIHR- arr. droit (MIHR)	☐	
☐	☐	KMY Mycologie (mycology)	☐ MIHL- arr. gauche (MIHL)	☐	
☐	☐	STUG Jument écouvillon (Culture bactériologique (aérobie)+Mycologie) (seulement cheval) (Mare swab (bacteriology and mycology incl.) (equine only))	☐ MI- monst.-réservoir (MI)	☐	
☐ - Vagin	☐	TEQ <i>Taylorella equigenitalis</i> (MCE) (seulement cheval) (equine only) (transport spéc. nécessaire!)	☐ Liquide de ponction (aspirate)	☐	PK1 Culture bactériologique (aérobie)
☐ - Clitoris	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)	☐ - Articulation (joint)	☐	PKAN Culture bactériologique (anaérobie) (utile en complément de la culture aérobie) (Bacteriology, anaerobic culture)
☐ - Col de l'utérus	☐	PKAN Culture bactériologique (anaérobie) (par exemple, plaie nécrotique profonde post-partum)	☐ - Cavité thoracique (thoracic cavity)	☐	KMY Mycologie (en cas de suspicion de mycose systémique, cryptococcidiose) (Mycology (if suspicious for systemic mycosis, cryptococcosis))
☐ - Utérus	☐	KMY Mycologie (mycology)	☐ - Cavité abdominale (abdominal cavity)	☐	
☐ APR- Prépuce (prepuce)	☐		☐ <i>Veuillez indiquer</i>	☐	
☐ APE- Pénis	☐		☐ Zone : (area)	☐	MRS Dépistage MRS (Staphylocoque résistant à la méthicilline) (MRS-Screening (methicillin resistant staphylococci)
☐	☐		<i>Veuillez indiquer</i>	☐	Autres examen (other):
☐ AWU Écouvillon, plaies (swab, wound)	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)		☐	<i>Veuillez indiquer</i>
☐	☐	PKAN Culture bactériologique (anaérobie) (anaerobic culture) (ex. blessures profondes, notamment morsures) (e.g. deep wounds, esp. bite wounds)		☐	
☐	☐	KMY Mycologie (mycology)		☐	

Voir au verso pour plus de tests.

Les antibiogrammes sont inclus systématiquement dès que des germes pathogènes sont détectés.

MATÉRIEL		EXAMEN (EXAMINATION)	
☐	Urine (urine)	☐	PK Culture bactériologique (aérobie), y compris le nombre de germes et le test d'inhibition (bacteriology, aerobic culture including bacterial count and inhibition test)
☐	zys- par cystocentèse (cystocentesis)	☐	UTES Analyse d'urine (urine analysis)
☐	kat- par sondage (catheter sample)	☐	SEDI Sédiment urinaire (urine sediment)
☐	spo- Miction spontanée (free flow)		
☐	ARE/AKL Écouvillon, rectum/cloaque (swab, rectal/cloaca)	☐	SPK Bactériologie des germes entéropathogènes (voir examen des selles) (germs (see faeces))
		☐	TPE Exam. de Salmonella uniquement (salmonella only)
		☐	KMY Mycologie (levures) (yeasts)
☐	Écouvillon, autre : (swab, other)	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)
		☐	PKAN Culture bactériologique (anaérobie) (anaerobic culture)
	<i>Veillez indiquer</i>	☐	KMY Mycologie levures (mycology)

MATÉRIEL		EXAMEN (EXAMINATION)	
☐	Raclage cutané/ poils (skin scraping/hair) <i>Veuillez indiquer</i>	☐	PK Culture bactériologique (aérobie) (aerobic culture) (NB : avant la désinfection à l'alcool, retirez les résidus !) (take scraping before alcohol disinfection)
		☐	KMY Culture fongique (levures, dermatophytes et champignons pathogènes) (yeasts, dermatophytes and pathogenic molds) (NB : procédez au raclage après avoir désinfecté à l'alcool !)
		☐	EKTO Ectoparasites (ectoparasites)
☐	BK Hémoculture (blood culture) 	☐	Analyse bactériologique, aérobie et anaérobie (+ levures) (Flacons spéciaux pour hémoculture disponibles sur demande) (Bacteriology, aerobic and anaerobic culture (incl. yeasts) special blood culture bottles on request)
☐	Autres : (other) <i>Veuillez indiquer</i>	☐	PK2 Culture bactériologique (aérobie) (bacteriology, aerobic culture)
		☐	PKAN Culture bactériologique (anaérobie) (bacteriology, anaerobic culture)
		☐	KMY Mycologie levures (mycology)

	Selles (Remarque : des analyses supplémentaires sur les échantillons de selles envoyés peuvent être demandées dans les deux jours suivant la réception de l'échantillon) (faeces) (Please note: Additional examinations of submitted faecal samples may be requested within 2 days after receipt of sample material.)		
	EXAMEN (EXAMINATION)		EXAMEN (EXAMINATION)
	PROFC Bilan diarrhée C (seulement chien, chat, furet) (Diarrh. Prof. C (canine, feline, ferret only)) Culture bactériologique (aérobie) (germes entéropathogènes), Endoparasites (petits animaux)- Flottation, y compris les coccidies, <i>Giardia</i>-Antigène, Cystoisospora-Antigène – Immunodosage, Cryptosporidium-Antigène – ELISA PROFE Bilan diarrhée E (seulement chien) (Diarrhoea Profile E (canine only)) Bilan diarrhée C + élastase – ELISA Les profils/tests combinés sont uniquement disponibles en combinaison avec le profil diarrhéique C/E. PDFP2S+ Bilan Diarrhée PCR PLUS chien (Canine Diarrhoea PCR Profile Plus) Coronavirus entérique canin CECov (ARN), Parvovirus canin 2 CPV-2 (ADN), Virus de la maladie de Carré (ARN), Gène de la toxine alpha de <i>C. perfringens</i> (ADN, quantitatif), Gène de l'entérotoxine de <i>C. perfringens</i> (ADN, quantitatif), <i>C. perfringens</i> netE Tox gènes (ADN, quantitatif), Circovirus Canin (ADN) PDFPKS+ Bilan Diarrhée PCR PLUS chat (Feline Diarrhoea PCR Profile Plus) Coronavirus félin FCoV (ARN), Parvovirus félin FPV (ADN), Trichomonas foetus (ADN), gène de la toxine alpha de <i>C. perfringens</i> (ADN, quantitatif), gène de l'entérotoxine de <i>C. perfringens</i> (ADN, quantitatif) PHDHS+ Bilan PCR diarrhée hémorragique chien Parvovirus canin 2 CPV-2 (ADN), Circovirus Canin (ADN), <i>C. perfringens</i> netE Tox gènes (ADN, quantitatif) NEMAES+ Bilan Fecal Dx™ antigénique – Immunodosage – chien, chat (<i>Dipylidium caninum</i>, ascaris, trichures, ankylostome, <i>Cystoisospora</i>) PDP Bilan diarrhée cheval (adulte) (Diarrhoea Profile – Adult Horses) Culture aérobie (germes intestinaux + antibiogramme) ; Technique combinée de sédimentation-flottation, <i>Clostridium difficile</i> Toxine A-Gen (ADN), <i>Clostridium difficile</i> Toxine B-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> alpha-Toxine-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> Entérotoxine-Gen (ADN), Coronavirus (PCR) PDF1 Bilan diarrhée poulain 1 (moins de 2 mois) (Diarrhoea Profile - Foal 1 (up to 60 days)) Culture aérobie (germes intestinaux + antibiogramme) ; Technique combinée de sédimentation-flottation, <i>Clostridium difficile</i> Toxine A-Gen (ADN), <i>Clostridium difficile</i> Toxine B-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> alpha-Toxine-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> Entérotoxine-Gen (ADN), Rotavirus équin (PCR), Coronavirus équin (PCR) PDF2 Bilan diarrhée poulain 2 (âge: 2 à 6 mois) (Diarrhea profile - Foal 2 (older foals / 2 to 6 months)) Culture aérobie (germes intestinaux + antibiogramme) ; Technique combinée de sédimentation-flottation, <i>Clostridium difficile</i> Toxine A-Gen (ADN), <i>Clostridium difficile</i> Toxine B-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> alpha-Toxine-Gen (ADN), <i>Clostridium perfringens</i> Entérotoxine-Gen (ADN), <i>Lawsonia intracellularis</i> (PCR), <i>Prescottella (Rhodococcus) equi</i> (PCR), Rotavirus équin (PCR), Coronavirus équin (PCR) Bactériologie et mycologie (bacteriology and mycology) SPK Bactériologie, bactéries entéropathogènes (enteropathogenic germs) (<i>Salmonella</i>, <i>Campylobacter</i>, <i>Yersinia</i> et autres germes pathogènes spécifiques à certaines espèces) TPE Examen de <i>Salmonella</i> uniquement (Bacteriology, <i>Salmonella</i> only) SPKAN <i>Clostridium perfringens</i> (culture, quantitatif) (culture, quantitative) KMY2 Mycologie (levures, culture, quantitatif) (yeasts, culture, quantitative) PAS Mégabactéries (<i>Macrorhabdus ornithogaster</i>) – coloration (seulement oiseaux) (<i>Macrorhabdus ornithogaster</i> – stain (bird only)) MIK <i>Cyniclomyces guttulatus</i>, microscopique (seulement chien, chat, lapin, cochon d'Inde, chinchilla) (microscopy (dog, cat, rabbit, guinea pig, chinchilla only))		PARASITOLOGIE (parasitology) PAT Endoparasites (petits animaux)- Flottation fécale par centrifugation (Parasitologie incl. coccidia (faeces)) NEMAE Bilan Fecal Dx™ antigénique (chien, chat) (<i>Dipylidium caninum</i>, ascaris, trichures, ankylostome, <i>Cystoisospora</i>; immunodosage) Ce profil combiné est uniquement disponible en association avec le profil antigenique Fecal Dx™. (Profil complémentaire disponible uniquement avec le profil antigenique Fecal Dx.) PATS+ Endoparasites (petits animaux) – Flottation fécale par centrifugation (chien, chat) PATK Endoparasites: grands animaux et ruminants (Technique combinée de sédimentation-flottation) PATRP Endoparasites (reptiles et amphibiens) – PAT + préparation native avec et sans coloration PATA Endoparasites (primates) – comme PATRP FECG Bilan Fecal Dx™ Antigène plus Giardia (chien, chat) (<i>Dipylidium caninum</i>, Ascaris, trichures, ankylostome, <i>Cystoisospora</i> et <i>Giardia</i>; immunodosage) FECGP Bilan Fecal Dx™ Antigène plus Giardia incl. Procédé de flottation – Dosage immunologique + flottation chien, chat (<i>Dipylidium caninum</i>, Ascaris, trichures, ankylostome, <i>Cystoisospora</i> et <i>Giardia</i>; immunodosage, Flottation fécale par centrifugation) PID Identification de parasites (Parasite identification) (vers, structures macroscopiques, arthropodes ; - pas de matières fécales) (no faeces) LAE <i>Giardia</i> Antigène – immunodosage KRE Cryptosporidia Antigène – ELISA LUW Nématode et larves de ver pulmonaire (Méthode de Baermann) SED Sédimentation sans fixateur (trématodes) (ruminants, chevaux) (Trematoda – Sedimentation without fixative (ruminants, horse)) MIFC Sédimentation avec fixateur : Recherche + identification endoparasites par sédimentation (excepté ruminants, chevaux) (except horse, ruminants)) MCM Comptage d'oeufs dans les selles (grands animaux) – Coproscopie de McMaster (McMaster egg counting technique) MCWE Comptage d'oeufs dans les selles (petits animaux) – Technique de Wisconsin/McMaster PATSW Dépistage d'endoparasites (ruminants) – Flottation fécale par centrifugation, Sédimentation, Nématode et larves de ver pulmonaire (bovins, ovins, caprins, alpagas, lamas uniquement) (ruminants endoparasite screening) PATI Dépistage d'endoparasites (hérisson) comme PATSW (seul hérisson) Virus entéropathogènes (enteropathogenic virus) COR Coronavirus Antigène – Immunochromatographie (seulement bovin) (coronavirus (ag) – Immunochromatography (bovine only)) PAVEIA Parvovirus Antigène – EIA, Immunochr. (seulement chien et chat) (parvovirus (ag) – Immunochr., EIA (canine, feline only)) ROT Rotavirus Antigène – Immunochromatographie VEMI Détection de virus – Microscopie électronique (general virology (electron microscopy)) Autres examens des selles (other examinations (faeces)) ELA Élastase Antigène – ELISA (seulement chien) (elastase – ELISA (canine only)) BL Sang occulte (Exigences, voir liste des prix) (occult blood)

Les antibiogrammes sont inclus par défaut dès que des germes pathogènes sont détectés. Utilisez le formulaire de demande « Diagnostic moléculaire » pour les tests PCR supplémentaires.