

Merci de remplir en MAJUSCULES.

Propriétaire

CODE BARRE

Collez
ici votre
code
barre

INFORMATIONS SUR L'ANIMAL

☐ Chien

☐ Chat

☐ Cheval

☐ Bovin

☐ Oiseau

☐ Reptile

☐ Autre espèce animale

☐ numéro de micropuce

☐ mâle

☐ femelle

☐ castré(e)

☐ Âge

Nom de l'animal

IDEXX

IDEXX Laboratorium

Vet Med Labor GmbH
Humboldtstraße 2
D-70806 Kornwestheim
Germany

Tel.: 02 - 700 64 38
(Du lundi au vendredi 9:00 - 17:30)
E-mail: laboratoire@idexx.com

DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE 2026 BEFR

NE PAS REMPLIR

☐ EB

☐ AB

☐ U

☐ K

☐ Gew

☐ LI

☐ Zecke

☐ PU

CACHET DU VÉTÉRINAIRE

En envoyant ce formulaire au laboratoire, vous acceptez nos conditions générales : www.idexx.be

IDEXX accorde une grande importance au traitement correct des données personnelles et applique la politique de confidentialité disponible à l'adresse www.idexx.com/privacy.

BILANS PCR

☐ Bilan anémie, standard (Chien) AHPPK [SgE]
Anaplasma spp., *Babesia* spp. *sensu stricto*, *Babesia vulpes*, *Cand. Mycoplasma haematoparvum*, *Mycoplasma haemocanis*, *Neoehrlichia mikurensis*, *Rickettsia conorii*

☐ Bilan anémie, grand (Chien) AHPPG [SgE]
Anémie standard+*Ehrlichia* spp., *Hepatozoon* spp., *Leishmania* spp. (quant.)

☐ Bilan des voies respiratoires supérieures –Écouvillon (Chien) POAH [ES]
Adénovirus canin de type 2, Herpèsvirus canin de type 1, Parainfluenzavirus canin (A, Influenzavirus canin, Coronavirus respiratoire canin, Virus de la maladie de Carré (quantitatif), *Mycoplasma cynos*, *Bordetella bronchiseptica*

☐ Bilan des voies respiratoires supérieures – LBA (Chien) POAHB [LBA]
Bordetella bronchiseptica, Adénovirus canin 2, Distempervirus CDV (qualitatif), Herpèsvirus canin 1 CHV-1, Parainfluenzavirus canin, Influenzavirus canin, Coronavirus respiratoire canin, *Mycoplasma cynos*

☐ Index de dysbiose (Chien) DYSBIND [F réf.r.]^a

☐ Bilan entéropathie chronique (Chien) CIBD [S + F réf.r.]^{a, b}

☐ Bilan diarrhée hémorragique (Chien) PHDH [F]
Parvovirus Canine 2 CPV-2, Circovirus Canine, gène de la toxine E/F de *Clostridium perfringens* *net* (quantitatif)

☐ Bilan diarrhée (Chien) CDPPC [F]
Giardia spp., *Cryptosporidium* spp., *Salmonella* spp. (pathogène), *Clostridium perfringens* entérotoxine (gène), *Clostridium perfringens* alpha-toxine (gène), Coronavirus canin entérique, Parvovirus canin 2, Paramyxovirus canin (Maladie de Carré), CECoV, *Campylobacter coli*, *Campylobacter jejuni*

☐ Bilan infertilité/avortement ABORTP [ES + EM]
Brucella spp., CHV-1, *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., bactériologie (aérobie)

☐ Bilan vers pulmonaires (Chien) LUNGWP [F, LBA]
Angiostrongylus vasorum, *Crenosoma vulpis*

☐ Bilan anémie (Chat) AKPP [SgE]
Anaplasma spp., *Bartonella* spp., *Cand. Mycoplasma haemominutum*, *Cand. Mycoplasma turicensis*, *Mycoplasma haemofelis*, *Cytauxzoon* spp., FeLV (quant.), FIV, *Hepatozoon* spp.

☐ Bilan oculaire (Chat) KAUGP [ES]
Chlamydia felis, *Mycoplasma felis*, Feline Herpesvirus 1 FHV-1 (quantitatif), Feline Calicivirus FCV

☐ Bilan des voies respiratoires supérieures –Écouvillon (Chat) POAK [ES]
Bordetella bronchiseptica, *Chlamydia felis*, Feline Calicivirus FCV, Feline Herpesvirus 1 FHV-1 (quant.), *Mycoplasma felis*

☐ Bilan des voies respiratoires supérieures – LBA (Chat) POAKB [LBA]
Bordetella bronchiseptica, *Chlamydia felis*, Calicivirus félin FCV, Herpèsvirus FHV-1 (qualitatif), *Mycoplasma felis*

☐ Index de dysbiose (Chat) DYSBINDK [F con.]^a

☐ Bilan hémobartonellose (Chat) PFHM [SgE]
Mycoplasma haemofelis, *Cand. Mycoplasma haemominutum*, *Candidatus*, *Mycoplasma turicensis*

☐ Bilan diarrhée (Chat) FDPCC [F]
Trichomonas foetus, *Giardia* spp., *Cryptosporidium* spp., *Toxoplasma gondii*, *Salmonella* spp. (pathogène), Gène de l'entérotoxine de *Clostridium perfringens*, Gène de la toxine alpha de *Clostridium perfringens*, Coronavirus félin (FCoV), Parvovirus félin (FPV), *Campylobacter coli*, *Campylobacter jejuni*

☐ Bilan fièvre d'origine indéterminée (Chat) FUGKPP [SgE]
Anaplasma spp., *Bartonella* spp., Calicivirus félin FCV, Coronavirus félin FCoV, *Cand. Mycoplasma haemominutum*, *Cand. Mycoplasma turicensis*, *Mycoplasma haemofelis*, *Cytauxzoon* spp., Feline Parvovirus FPV, FeLV (quant), FIV, *Hepatozoon* spp.

BILANS DES TIQUES

☐ Dermatophytes RealPCR™ Test DERMP [raclage cutané, poils, y compris la racine, tissu] *Microsporum* spp., *Microsporum canis*, *Trichophyton* spp.

☐ Bilan maladies à tiques 3 – sang (Chien) PZB [SgE]
Anaplasma spp., *Babesia* spp., *Ehrlichia* spp., *Hepatozoon* spp.

☐ Bilan maladies à tiques 3 – sang (Chat) PZBK [SgE]
Anaplasma spp., *Bartonella* spp., *Cytauxzoon* spp., *Hepatozoon* spp.

☐ Bilan maladies à tiques 4 – Les tiques des chiens PZ [tique]
Selon l'espèce de tique. Ixodes : *Anaplasma* spp., *Borrelia burgdorferi* *sensu lato*, virus FSME, *Hepatozoon*; Rhipicephalus : *Anaplasma* spp., *Babesia* spp., *Ehrlichia* spp.

☐ Bilan maladies à tiques 6 – Les tiques des chats PZK [tique]
Selon l'espèce de tique (voir liste des prix)

☐ Bilan maladies à tiques 7 – Les tiques des chevaux PZP [tique]
Selon l'espèce de tique (voir liste des prix)

☐ Bilan Helicobacter (rongeurs) HELPCR [F]
Helicobacter spp., différenciation entre : *H. bilis*, *H. ganmani*, *H. hepaticus*, *H. rodentium*, *H. typhlonius*, *H. mastomyrinus*

☐ Bilan aviaire 1 PV-1 [V + SgE + ES, F]
PBFD virus, Polyomavirus

☐ Bilan aviaire 2 PV-2 [V + SgE + ES, F]
Bilan aviaire 1 + *Chlamydia* spp. + *C. psittaci*

☐ Bilan aviaire 3 PV-3 [V + SgE + ES, F]
Bilan aviaire 1 + sexage

☐ Bilan aviaire 4 PV-4 [V + SgE + ES, F]
Bilan aviaire 1 + *Chlamydia* spp. + *C. psittaci* + sexage

À remplir pour les demandes de profil d'oiseau 3 ou 4 :

Espèce d'oiseau:

Num. d'anneau:

Num. de puce:

☐ Certificat souhaité

☐ Streptococcus equi, dépistage des infections (équin) DRUSP [V]
Streptococcus equi subsp. *equi*, *S. equi* subsp. *zooepidemicus*, *S. dysgalactiae* subsp. *equisimilis*

☐ Bilan Babesia (équin) BABEQP [SgE]
Babesia caballi, *Theileria equi*

☐ Bilan des maladies respiratoires (cheval) POAP [EnA]
Virus de l'artérite équine, EHV-1, EHV-4, Virus de la grippe équine, *Streptococ. equi* subsp. *equi*

☐ Bilan des maladies respiratoires (poulain) POAF [EnA]
Bilan des maladies respiratoire du cheval + *Prescottella (Rhodococcus) equi*

☐ Bilan fièvre d'origine indéterminée complet (cheval) FUGPCP [SgE + EnA, L + F]
Adénovirus équin, Virus de l'artérite équine, Coronavirus équin, EHV-1, EHV-4, Virus de la grippe équine, Virus de la rhinite équine A (ERAV), Virus de la rhinite équine B (ERBV), *Streptococcus equi* subsp. *equi*, *Streptococcus equi* subsp. *zooepidemicus*, *Anaplasma* spp., *Babesia caballi*, *Theileria equi*

☐ Bilan fièvre d'origine indéterminée standard (cheval) FUGPSP [SgE + EnA, L + F]
Virus de l'artérite équine (EAV), coronavirus équin, EHV-1, EHV-4, virus de la grippe équine (EIV/H3N8), virus de la rhinite équine A (ERAV), virus de la rhinite équine B (ERBV), *Streptococcus equi* subsp. *equi*, *Anaplasma* spp., *Babesia caballi*, *Theileria equi*

☐ Bilan des voies respiratoires supérieures (bovin) POAR [ES, trach. ES, LBA]
Mycoplasma bovis, Virus Parainfluenza bovin 3, Virus respiratoire Syncytial bovin

^a Si l'indice de dysbiose est demandé en même temps que d'autres analyses de selles, placez l'échantillon destiné à l'indice de dysbiose dans un récipient séparé, conservez-le au frais et envoyez-le réfrigéré.

^b Le patient doit être à jeun depuis au moins 8 à 12 heures.

Schrijf het monster type op het buisje indien u een huddere vloeistof zoals serum, plasma of urine instuurt.

Détection d'agents pathogènes par PCR		
☐	Adénovirus 1, équin (ADN)	EADV1 [SgE, ES]
☐	Adénovirus 2, canin (ADN)	CAV2P [ES]
☐	Adénovirus cochon d'Inde (GPA ^a v)	CGPAP [poumon, trachée (écouvillon buccal)]
☐	Adénovirus Reptiles (ADN)	ADVP [F, ES]
☐	<i>Anaplasma</i> spp. (ADN)	ANASP [V]
	<i>A. phagocytophilum</i> , <i>A. platys</i>	
☐	<i>Angiostrongylus vasorum</i> (ADN)	ANGVP [SgE, F (échantillon comp. de 3 jours)]
☐	Arénavirus (ARN) (Serpent)	ARVP [SgE, SgH, tissu dans NaCl]
☐	Artéritis Virus, equine (ARN)	EAVP [V]
☐	<i>Babesia caballi</i> (ADN)	BABCAP [V]
☐	<i>Babesia felis</i> (ADN)	BABFP [SgE]
☐	<i>Babesia</i> spp. (ADN) (Pas cheval)	BABEP [SgE]
☐	<i>Babesia</i> spp. (ADN) (Canin)	BABSP [SgE]
	<i>Babesia canis canis</i> , <i>B. canis vogeli</i> , <i>B. canis rossii</i> , <i>B. gibsoni</i> , <i>B. conradae</i> , incl. diff.	
☐	<i>Babesia vulpes</i> (ADN)	BABVP [SgE]
☐	<i>Bartonella</i> spp. (ADN)	BARTSP [SgE, LCR]
☐	Bornavirus (ARN)	BORNAG [LCR]
☐	Bornavirus, aviaire (ARN)	ABVP [F]
☐	<i>Borrelia burgdorferi</i> sensu lato (ADN)	BORRG [V]
☐	BRSV virus respiratoire syncytial bovin (ARN)	BRSVP [ES]
☐	<i>Brucella</i> spp. (ADN)	BRUCSP [V]
☐	Calicivirus, félin FCV (ARN)	CALIP [ES]
☐	<i>Campylobacter coli</i> (ADN)	CAMCP [F]
☐	<i>Campylobacter jejuni</i> (ADN)	CAMJP [F]
☐	Circovirus (ADN) (Canin)	CIRVP [F]
☐	Pneumovirus (ARN) (Canin)	CPNEUP [ES]
☐	<i>Chlamydia felis</i> (ADN)	CPFE [ES]
☐	<i>Chlamydia psittaci</i> (ADN)	CHLVPP [ES, F]
☐	<i>Chlamydia</i> spp. (ADN)	CHLSP [ES, F]
☐	<i>Clostridium difficile</i> toxine A (ADN)	CDAP [F]
☐	<i>Clostridium difficile</i> toxine B (ADN)	CDBP [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> alpha toxine gèn (quant.) (ADN) (Canin/Chat)	CPEAQ [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> enterotoxine gèn (quant.) (ADN) (Canin/Chat)	CPEEQ [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> alpha toxine gèn (qualitatif) (ADN)	CPEAP [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> enterotoxine gèn (qualitatif) (ADN)	CPEEP [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> netE+netF toxine gèn (quant.) (ADN) (Canin)	CPNETEQ [F]
☐	<i>Clostridium perfringens</i> netE+netF toxine gèn (qual.) (ADN) (Équin)	CPNETEP [F]
☐	<i>Clostridium piliforme</i> (rongeur) (ADN)	CLOPIP [F]
☐	Coronavirus entérique canin (CECoV) (ARN)	CCVP [F, ES]
☐	Coronavirus respiratoire canin (ARN)	CRCVP [ES]
☐	Coronavirus, équin (ARN)	ECOVF [F]
☐	Coronavirus félin FCoV, FeCV (ARN)	FCVP [F]
☐	<i>Crenosoma vulpis</i> (ADN)	CREVP [F (collectées sur 3 jours)]
☐	<i>Cryptococcus neoformans</i> / <i>C. gattii</i> (ADN)	CRYPNP [LCR, ES, F]
☐	<i>Cytauxzoon</i> spp. (ADN)	CYTSP [SgE]
☐	<i>Echinococcus</i> spp. (ADN)	ECHISP [F, Pu, tissu]
	y compris la différenciation <i>E. multilocularis</i> et <i>E. granulosus</i> sensu lato	
☐	<i>Ehrlichia canis</i> (ADN)	EHRAG [SgE]
☐	<i>Ehrlichia</i> spp. (ADN)	EHSP [SgE]
	<i>E. canis</i> , <i>E. ewingii</i> , <i>E. chaffeensis</i>	
☐	<i>Encephalitozoon cuniculi</i> (ADN)	CENCUMP [U, LCR]
☐	FelV (ADN proviral)	FELVP [BM]
☐	FelV Quant RealPCR™ (Progénome-ADN) (quantitatif)	FELVQ [SgE]
☐	FIP Virus RealPCR™ Test	FIPVP [PAF, tissu, (SgE) - pas FI ^a]
☐	FIP Virus Quant RealPCR™ Test	FIPVPQ [Pu]
☐	FIV (ADN proviral)	FIVP [SgE, BM]
☐	FIV (ADN proviral + ARN viral)	FIVDR [PE, As, LCR, ES, S]
☐	<i>Filobacterium rodentium</i> (CAR Bacillus) (ADN) CCARBP [ETr, tissu (trachée, poumon)]	
☐	Virus de l'encéphalite à tiques TBE (ARN)	FSMEP [V]
☐	<i>Giardia</i> spp. (ADN)	GIARSP [F]
☐	<i>Helicobacter</i> spp. (ADN)	HELIP [biops, F]
☐	Hepatozoon spp. (ADN)	HEPCP [SgE]
☐	Herpès virus 1, canin (CHV-1) (ADN)	CHV1 [V]
	y compris différenciation EHV-1 (neuropathogène)	
☐	Herpèsvirus équin 1 (EHV-1) (ADN)	EHV1P [V]
☐	Herpèsvirus équin 2 (EHV-2) (ADN)	EHV2 [ES]
☐	Herpèsvirus équin 4 (EHV-4) (ADN)	EHV4P [V]
☐	Herpèsvirus équin 5 (EHV-5) (ADN)	EHV5 [ES]

Détection d'agents pathogènes par PCR		
	Herpèsvirus 1, feline FHV-1 (ADN)	
☐	- Herpèsvirus 1 félin FHV-1 (ADN) quant.	FHV1Q [ES (nez, gorge, œil)]
☐	- Herpèsvirus 1 félin FHV-1 (ADN) qual.	FHV1 [ES (génitaux), tissu (fœtus avorté)]
☐	Herpèsvirus (ADN) (reptile)	SKHVP [ES]
☐	Influenza virus canin (ARN)	CIVP [ES]
☐	Virus de la grippe équine (Influenza équin) (ARN)	EIVP [V]
☐	Iridovirus (ADN) (reptile)	IRIDP [ES]
☐	<i>Lawsonia intracellularis</i> (ADN)	LAWIP [F]
	Leishmania spp. (ADN)	
☐	- <i>Leishmania</i> spp. (ADN) (qualitatif)	LEIP [As, biops]
☐	- <i>Leishmania</i> spp. (ADN) (quantitatif)	LEIQ [SgE, U, Sy]
☐	- <i>Leishmania</i> spp. écouvillon (ADN) (quantitatif)	LEIQC [ES]
☐	- <i>Leishmania</i> spp. Quantification (moelle osseuse)	LEIQBM [MO]
☐	<i>Leptospira</i> spp. (ADN)	LEPSPEU [SgE + U]
☐	<i>Leptospira</i> spp. (ADN)	LEPSP [V]
☐	<i>Listeria monocytogenes</i> (ADN)	LISP [V]
☐	Virus de la Chorioméningite lymphocytaire (ARN)	CLCVP [rein, U, F]
☐	<i>Microfilaires</i> (Pan-filaria, y compr. différenc.) (ADN) (Canin/Chat)	MIFILAP [SgE]
☐	<i>Mycoplasma agassizii</i> (ADN)	MAGP [V]
☐	<i>Mycoplasma bovis</i> (ADN)	MYBOP [ES]
☐	<i>Mycoplasma cynos</i> (ADN) Canin	MYCYP [ES]
☐	<i>Mycoplasma felis</i> (ADN)	MYCOFE [ES]
☐	<i>Mycoplasma haemocanis</i> , <i>Cand. M. haematoparvum</i> (ADN) (Canin)	CHM SgE]
☐	<i>Mycoplasma</i> spp. (ADN)	MYCOPCR [V]
☐	Myxomatose, lapin (ADN)	MYXOP [ES, tissu]
☐	<i>Neoehrlichia mikurensis</i> (ADN)	NEOMIP [SgE]
☐	<i>Neospora</i> spp. (ADN)	NEOSP [LCR, F]
☐	Virus parainfluenza de type 3 bovin PCR (ARN)	BPV3P [ES]
☐	Virus parainfluenza, canin (ARN)	CPVVP [ES]
☐	Paramyxovirus, serpent (ARN)	PARAMS [ES]
☐	Parvovirus, canin CPV-2 (ADN)	FCPVP [ES, F]
☐	Parvovirus, félin FPV (ADN)	FPVP [ES, F]
☐	PBFD (ADN) (Oiseau)	PBFD1 [V + SgE + ES, F]
☐	Polyomavirus (ADN) (Oiseau)	APV1 [V + SgE + ES, F]
☐	<i>Prescottella (Rhodococcus) equi</i> (ADN)	RHEP [V]
☐	Ranavirus (ADN) (Reptile)	RANAP [ES]
☐	<i>Rickettsia conorii</i> (ADN)	RICKCP [SgE]
☐	Rotavirus, équin (ARN)	ERVVP [F]
☐	IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ ^d	COVIDP [écouvillon (oral), F]
☐	IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) de suivi RealPCR™ ^{me,d}	COVIDPFU [écouvillon (oral), F]
	Distempervirus, canine (CDV) (ARN)	
☐	- Virus de la maladie de Carré (ARN) (qualitatif)	STAP [V]
☐	- Virus de la maladie de Carré Quant RealPCR™ (ARN)	STAPQ [ES]
☐	<i>Streptococcus canis</i> (groupe G) (ADN)	STCAP [V]
☐	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i> (ADN) (équin)	STEEP [ENa]
☐	<i>Taylorella asinigenitalis</i> (ADN)	TAYASP [ES, tissu]
☐	<i>Taylorella equigenitalis</i> (MCE) (ADN)	TAYEP [ES, tissu]
☐	<i>Theileria equi</i> (ADN)	THEQP [SgE]
☐	<i>Toxoplasma gondii</i> (ADN)	TOXP [V, pas Fèces]
☐	VGET (virus de la gastro-entérite transmissible) (ARN)	TGEVP [F]
☐	<i>Treponema paraluis-cuniculi</i> (ADN)	TREPP [ES, tissu]
☐	<i>Tritrichomonas foetus</i> (ADN)	TTFP [F]
☐	Virus du Nil occidental (ARN)	WNVP [Chevaux: Li, Poids/Oiseaux: Ab, Gew., SgE]
	Remarques:	

Abréviations:		
[As]	Aspirat	[P]
[ENa]	Écouvillon nasopharyngé	[Pu]
[ES]	Écouvillon sur tube sec	[PAF]
[EM]	Écouvillon sur milieu de transport	[réfr.]
[ETr]	Écouvillon trachéal	[SgE]
[F]	Fèces	[Sy]
[L]	Lavage	[U]
[LCR]	Liquide céphalo-rachidien	[V]
[MO]	Moelle osseuse	

^a Fèces, voir Coronavirus, félin. ^b Consultez VetConnect PLUS ou la liste des prix pour connaître le matériel nécessaire. ^c Le test de suivi ne peut être demandé qu'après un profil PCR. ^d Compte tenu de l'évolution rapide de cette maladie, consultez notre site web pour obtenir les informations les plus récentes.